

Prueba de audición para recién nacidos

Programa de Detección e Intervención Temprana de la Audición (EHDI)



¿Y si mi bebé necesita más pruebas?

Si su bebé no pasa la prueba de audición o tiene factores de riesgo de pérdida auditiva, es importante que realicen más pruebas lo antes posible. Los bebés y los padres empiezan a comunicarse de inmediato a través de la voz, el tacto y las expresiones, ¡así que disfrute mucho de estos momentos especiales juntos!

¿Por qué mi bebé necesita más pruebas?

No pasó las pruebas iniciales: Si su bebé no pasó la prueba de audición neonatal, posiblemente tenga líquido temporal en el oído, movimiento durante la prueba o pérdida auditiva real. Para saberlo con certeza, realicen más pruebas antes de los tres meses de edad.

Factores de riesgo: Incluso si su bebé ha superado la prueba inicial, ciertos factores de riesgo podrían provocar pérdida auditiva más adelante. Entre ellos se encuentran:

- o Antecedentes familiares de pérdida auditiva
 - o Exposición a ciertas infecciones antes del nacimiento
 - o Ictericia que requiere una transfusión de sangre
 - o La forma de la cabeza, rostro u orejas son diferentes
 - o Estadia en la UCI neonatal de más de cinco días
 - o Falta de oxígeno al nacer
 - o Exposición a ciertos medicamentos
 - o Síndromes identificados al nacer
- Si alguna de estas situaciones ocurren o si le preocupa la audición de su bebé, vuelvan a realizar más pruebas entre los 9 y 12 meses.

¿Qué pasará ahora?

1. Referencia con un audiólogo: El centro de parto de su bebé le referirá con un audiólogo (un experto en audición). Asegúrese de que el audiólogo tenga experiencia trabajando con bebés. También puede pedirle una referencia al médico de su bebé.
2. Pruebas realizadas por un audiólogo: El audiólogo hará las pruebas mientras su bebé duerme. Estas pruebas son seguras y no son dolorosas. Ellos determinarán si:
 - o No hay pérdida de audición
 - o Hay pérdida auditiva temporal o tratable (para la cual su bebé será referido para tratamiento)
 - o Hay pérdida auditiva permanente (para la cual será necesario un cuidado continuo)
3. Cuidados de seguimiento: Si la pérdida auditiva se detecta a tiempo y se aborda con rapidez, es más probable que su bebé desarrolle habilidades de comunicación a la par de sus compañeros. Si es necesario, serán referidos a especialistas médicos, al programa de First Steps en intervención temprana y recibirá apoyo a través de programas como Guide by Your Side.

Estamos aquí para ayudarle:

Programa de Detección e Intervención Auditiva Temprana (EHDI por sus siglas en inglés):

- Forma parte del Programa de Pruebas Neonatales de Indiana.
- Para preguntas sobre la audición de su bebé o para recibir ayuda, llame al 317-233-0886 o al 317-233-0888 (para español) o visite www.hearing.in.gov

Contacte a su médico:

- Contacte a su médico de cabecera para la salud y necesidades médicas de su bebé.

Sistema de Intervención Temprana de Primeros Pasos:

- Ofrece apoyo a bebés con retrasos en el desarrollo desde el nacimiento hasta los tres años
- Para más información visite la página web www.in.gov/fssa/firststeps

Para preguntas sobre cómo encontrar un médico, seguro u otros recursos familiares:

- Llame al 1-844-MCH-MOMS (1-844-624-6667) o visite la página web www.momshelplineindiana.com



¿Necesita más información?

¡Contáctenos!

ehdi@health.in.gov

Early Hearing Detection & Intervention Program
Indiana Department of Health
www.Hearing.in.gov
phone: 317-232-0972

¿Qué es la pérdida auditiva?

Algunas pérdidas auditivas, como a causa de líquido o cera, pueden tratarse médicamente. La pérdida auditiva permanente suele requerir amplificaci3n, como audífonos. El audi3logo de su beb3 hablar3 sobre las opciones disponibles.

Una pérdida de audi3ci3n leve o de un solo oído a3n puede causar retrasos en el habla y el lenguaje, por lo que es fundamental que le hagan pruebas a su beb3.

No. La detecci3n temprana es vital para el desarrollo del habla y el lenguaje. Los beb3s pueden ser evaluados a cualquier edad. Sin embargo, las pruebas de seguimiento del cribado auditivo neonatal deben realizarse antes de que su beb3 cumpla tres meses para obtener los mejores resultados. Las pruebas para beb3s mayores de 3 meses pueden requerir sedaci3n.



¿Cuántos beb3s nacen con p3rdida auditiva cada a3o? En Indiana, aproximadamente de 2 a 3 beb3s de cada 1,000 nacen con p3rdida auditiva permanente.

¿Qué significa "referir" en el contexto de evaluaci3n auditiva de reci3n nacidos? Significa que su beb3 no pas3 el tamiz y necesita pruebas adicionales para determinar su estado auditivo. Las pruebas de seguimiento deben realizarse antes de los tres meses de edad.

¿Qué es un audi3logo? Un audi3logo es un profesional titulado con formaci3n especializada para analizar y diagnosticar la p3rdida auditiva. No todos los audi3logos est3n capacitados para hacer pruebas a beb3s, así que busque uno con experiencia en nuestra p3gina web.

Si mi beb3 reacciona a ruidos fuertes, ¿a3n necesita hacerse estas pruebas? S3. Los diferentes niveles de p3rdida auditiva significan que posiblemente su beb3 escuche sonidos m3s suaves o de nivel medio. Un examen de audiolog3a deber3a realizarse antes de los tres meses de edad.

¿Es com3n la p3rdida de audi3ci3n y la sordera? S3, la p3rdida auditiva es una de las condiciones m3s comunes detectadas al nacer, afectando de 1 a 3 beb3s por cada mil. Las pruebas tempranas son importantes incluso sin antecedentes familiares de p3rdida auditiva.

Si mi beb3 a3n no puede hablar, ¿puedo esperar para hacer la prueba? No. Los beb3s comienzan a escuchar desde el nacimiento, y la detecci3n temprana de la p3rdida auditiva es crucial para su desarrollo del habla y lenguaje.

¿C3mo puedo pagar la prueba de audi3ci3n si no tengo seguro? Medicaid y la mayor3a de los seguros privados cubren estas pruebas. Algunos proveedores ofrecen opciones gratuitas o ayuda. Consulte con su proveedor y revise nuestra p3gina web para ver la lista de audi3logos disponibles.

¿Si mi beb3 tiene l3quido en los o3dos, la prueba ser3 precisa? Si. Las pruebas especiales pueden diferenciar entre p3rdida auditiva debido a l3quido y p3rdida permanente. Puede ser necesario repetir las pruebas una vez que el l3quido haya disminuido.

Si mi beb3 pas3 la prueba en un o3do, ¿todav3a necesita hacerse el examen? S3. La p3rdida auditiva en un o3do puede afectar al habla, el lenguaje y el aprendizaje. Es importante monitorear y analizar ambos o3dos.

¿Necesita m3s informaci3n?

¡Cont3ctenos!

ehdi@health.in.gov

Early Hearing Detection & Intervention
Program | Indiana Department of Health
www.Hearing.in.gov
phone: 317-232-0972